

<https://helda.helsinki.fi>

---

## Toimimattomat haiman neuroendokriiniset kasvaimet

Sallinen, Ville

2018

---

Sallinen , V , Schalin-Jääntti , C , Luukkonen , L , Sirén , J , Nordin , A , Arola , J & Tarkkanen , M 2018 , ' Toimimattomat haiman neuroendokriiniset kasvaimet ' , Duodecim , Vuosikerta. 134 , Nro 3 , Sivut 271-279 . < <http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo14153> >

---

<http://hdl.handle.net/10138/301341>

---

publishedVersion

---

*Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.*

*This is an electronic reprint of the original article.*

*This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.*

*Please cite the original version.*

Ville Sallinen, Camilla Schalin-Jäntti, Liisa Luukkonen, Jukka Sirén,  
Arno Nordin, Johanna Arola ja Maija Tarkkanen

## Toimimattomat haiman neuroendokriiniset kasvaimet

Toimimattomia haiman neuroendokriinisia kasvaimia löydetään yhä enemmän kuvantamisen lisääntymisen seurauksena. Näiden kasvainten käyttäytyminen on hyvin vaihtelevaa, sillä niitä on indolenteista erittäin aggressiivisesti leviäviin. Tätä vaihtelua kuvaa hyvin vuonna 2017 päivittynyt WHO:n histologinen luokittelu. Pienikokoisia pienen graduksen paikallisia kasvaimia voidaan tapauskohtaisesti seurata, mutta muiden kasvainten kuratiivistavoitteinen hoito vaatii niiden poiston. Näihin leikkauksiin liittyy merkittävä komplikaatoriski, jolloin oikea potilasvalinta korostuu. Kun tauti on paikallinen, voidaan pyrkiä parantavaan hoitoon, ja lisääntyneet hoitovaihtoehdot ovat selvästi pidentäneet levinnyttä tautia sairastavien potilaiden elinajan odotetta. Haiman neuroendokriinisen kasvaimen ennuste on erinomainen, kun gradus on pieni, ja potilaiden elinajan odote on jopa kymmeniä vuosia.

**H**aiman neuroendokriiniset (NE-) kasvaimet saavat alkunsa Langerhansin saarekkeen soluista. Nämä kasvaimet voivat erittää aktiivisia hormoneja, esimerkiksi insuliinia, gastriinia, glukagonia, somatostatiiinia, kortikotropiinia tai vasoaktiivista suolipeptidiä (VIP), jotka aiheuttavat hormonien liikaerityksen oirekuvan. Tällöin niitä kutsutaan toiminnallisiksi. Toimimattomatkin kasvaimet voivat erittää hormoneja, mutta erittyvät aineet ovat joko inaktiivisia tai niitä erittyy niin pieni määrä, että ne eivät aiheuta oireita. Toiminnalliset kasvaimet tulee aina pyrkiä hoitamaan kirurgisesti, jos se on mahdollista. Keskitymme tässä katsauksessa toimimattomiin kasvaimiin, jollaisia 90 % haiman NE-kasvaimista on. Näiden kasvainten kansainvälisiä hoitosuosituksia, esimerkiksi pohjoismaista NNTG:n (Nordic Neuroendocrine Tumour Group) sekä eurooppalaista ENETS:n (European Neuroendocrine Tumor Society) suositusta, päivitetään säännöllisesti (1,2,3).

### Kasvainten käyttäytyminen vaihtelee indolenteista erittäin aggressiivisiin

### Epidemiologia ja etiologia

Noin 5 % haimakasvaimista on neuroendokriinisia, ja niiden ilmaantuvuus on noin 5:1 000 000. Vaikka NE-kasvainten ilmaantuvuus on viime vuosina lisääntynyt, on levinneenä löydettyjen kasvainten määrä pysynyt vakiona. Tämä viitanee siihen, että valtaosa kuvantamistutkimuksissa sattumalta löydettyistä kasvaimista on harmittomia (4). Suurin osa eli

70–90 % haiman NE-kasvaimista on sporadisia. Jäljelle jäävien 10–30 %:n taustalla on jokin geneettinen oireyhtymä, joka altistaa NE-kasvaimelle. Näistä oireyhtymistä tärkein on MEN 1 -oireyhtymä (multipple endokriininen

neoplasia) (5). MEN 1 -oireyhtymän mahdollisuus on huomioitava erityisesti, jos potilas on nuori ja jos suvussa on jo todettu oireyhtymään sopivia kasvainmanifestaatioita. Noin 70 %:lle MEN 1 -oireyhtymää sairastavista kehittyy jossain elämänvaiheessa haiman NE-kasvain, usein useampikin, ja lisäksi haiman histolo-



**TAULUKKO 1.** Haiman NE-kasvaimen ja NE-karsinooman T-luokitus.

	ENETS	AJCC/UICC NET	AJCC/UICC NEC
T1	Kasvain ei infiltroi haiman ulkopuolelle ja sen koko on < 2 cm	Kasvain ei infiltroi haiman (haimaa ympäröivän rasvan) ulkopuolelle ja sen koko on ≤ 2 cm	Koko ≤ 2 cm
T2	Kasvain ei infiltroi haiman ulkopuolelle ja sen koko on 2–4 cm	Kasvain ei infiltroi haiman (haimaa ympäröivän rasvan) ulkopuolelle ja sen koko on > 2 cm mutta < 4 cm	Koko > 2 cm mutta < 4 cm
T3	Kasvain ei infiltroi haiman ulkopuolelle ja sen koko on > 4 cm, tai infiltraatio pohjukaissuoleen tai sappitiehyeen	Kasvain ei infiltroi haiman (haimaa ympäröivän rasvan) ulkopuolelle ja sen koko on > 4 cm, tai kasvain infiltroi pohjukaissuoleen tai sappitiehyeen	Koko > 4 cm
T4	Kasvain infiltroi viereisiin elimiin tai suuriin valtimoihin (sisusvaltimorunko, ylempi suolilievealtimo)	Kasvain infiltroi vatsakalvon läpi, toiseen elimeen tai viereisiin rakenteisiin	Kasvain infiltroi suuriin valtimoihin (sisusvaltimorunko, ylempi suolilievealtimo, yhteinen maksavaltimo)

ENETS = European Neuroendocrine Tumor Society, AJCC/UICC = American Joint Committee on Cancer/ Union for International Cancer Control (8. painos), NET = neuroendokriininen kasvain, NEC = neuroendokriininen karsinooma

gisessa tarkastelussa heiltä löytyy usein mikrokooppisen pieniä NE-kasvaimia. MEN 1-potilaiden yleisin kuolinsyy (noin 40 %) on haiman NE-kasvain (6). Harvinaisempia haiman NE-kasvaimille altistavia oireyhtymiä ovat von Hippel–Lindaun tauti (10–17 %:lle kehittyy haiman NE-kasvain), neurofibromatoosi 1 (alle 10 %:lle kehittyy haiman NE-kasvain) sekä tuberoosiskleroosi (alle 1 %:lle kehittyy haiman NE-kasvain) (5).

## Levinneisyysluokitus (TNM) ja histologinen erilaistumisaste (WHO)

Hoidon suunnittelua varten haiman NE-kasvaimet voidaan luokitella kahdella tavalla. TNM-luokitus perustuu kasvaimen paikalliseen ja etälevinneytyteen (**TAULUKKO 1**). On huomioitava, että TNM-luokituksia on kaksi, yhdysvaltalaisen AJCC:n ja UICC:n (American Joint Committee on Cancer ja Union for International Cancer Control) sekä eurooppalaisen ENETS:n luokitukset (7,8). Näiden ero on lähinnä kasvaimen eli T-luokituksen määritelmässä. ENETS:n luokitus vaikuttaa korreloivan hieman paremmin ennusteeseen kuin AJCC:n (9). Molemmat luokitukset jakautuvat imusolmuke- ja kauko-etäpesäkkeiden osalta luokkiin N0/1 ja M0/1.

Toinen luokittelu on WHO:n histologiaan perustuva luokittelu (**TAULUKKO 2**) (10). Luokan määrittelevät morfologinen erilaistuminen

sekä Ki-67-proliferaatioindeksi tai mitotoisien määrä. Gradus 1–2 kasvaimia kutsutaan NE-kasvaimiksi. WHO-luokitus päivittyi vuonna 2017 niin, että aiemmat gradus 3 kasvaimet jaettiin kahteen eri alaluokkaan niiden erilaistumisasteen mukaan. Gradus 3 kasvaimia kutsutaan joko NE-kasvaimiksi (NET, hyvin erilaistuneet) tai neuroendokriiniseksi karsinoomiksi (NEC, huonosti erilaistuneet). Lisäksi uutta luokituksessa on, että gradus 1 luokkaan määritellään kasvaimet, joiden Ki-67-proliferaatioindeksi on alle 3 % (aiemmin 2 % tai vähemmän). WHO-luokitus jaottelee kasvaimet niiden ennusteen mukaan paremmin kuin TNM-luokitus (11).

## Oireet ja diagnostiikka

Toimimattomat haiman NE-kasvaimet ovat yleensä oireettomia, kunnes etäpesäkkeet tai kasvaimen koosta seuraava painevaikutus aiheuttavat oireita. Sappitiehyn tukkeutuminen aiheuttaa ikteruksen ja haimatiehyttä komprimoiva kasvain voi aiheuttaa akuutin tai kroonisen haimatulehduksen ja lopulta haiman eksokriinisen vajaatoiminnan. Levinneen taudin oireita voivat olla laihtuminen, vatsakivut, pahoinvointi ja selittämätön lämpöily. Joskus haimakasvain voi aiheuttaa diabeteksen. Usein haiman NE-kasvain todetaan kuitenkin sattumalta esimerkiksi epä määräisen vatsakivun selvittelyissä.

**TAULUKKO 2.** Vuoden 2017 WHO-luokittelu (10).


Luokka	Mitooseja per 10 HPF	Ki-67	Erilaistumisaste
G1 NET	< 2	< 3 %	Hyvin erilaistunut
G2 NET	2–20	3–20 %	Hyvin erilaistunut
G3 NET	> 20	> 20 %	Hyvin erilaistunut
G3 NEC Pienisolainen tyyppi Suurisolainen tyyppi	> 20	> 20 %	Huonosti erilaistunut
Neuroendokriininen–ei-neuro- endokriininen sekakasvain	–	–	–

G = gradus; NET = neuroendokriininen kasvain; NEC = neuroendokriininen karsinooma; HPF = high power field, vahvan suurennoksen näkökenttä; Ki-67 = Ki-67-proliferaatioaste

Vatsan tietokonetomografia (TT) kolmivaiheisena (varhainen valtimo-, haimaparenkyy- mi- ja laskimovaihe) on ensilinjan jatkotutkimus haimakasvainten diagnostiikassa. Haiman NE-kasvaimet näkyvät TT:ssä useimmiten hypervaskulaarisina ja tarkkarajaisina. Haiman NE-kasvaimista 10 % on kystisiä, mutta tällöinkin niiden ympärys on yleensä hypervaskulaarinen. Myös munuaiskarsinooman etäpesäkkeet ja lisäperna ovat usein hypervaskulaarisia tarkkarajaisia pesäkkeitä, ja kystisistä muutoksista esimerkiksi musinoosi kystinen neoplasia (MCN) tai intraduktaalinen papillaarinen musinoosinen neoplasia (IPMN) sivutiehyessä voivat käyttäytyä kystisen NE-kasvaimen ta-

voin, mikä tulee huomioida erotusdiagnoos- tissa (**KUVA 1**).

Erityisesti jos kasvainta ei aiota leikata, tulee NE-kasvaimen diagnoosi varmistaa. Aiemmin käytettiin somatostatiinireseptoreiden gam- makuvausta, mutta <sup>66</sup>gallium-DOTANOC-po- sitroniemissiotomografia-tietokonetomografia (<sup>66</sup>Ga-DOTANOC-PET-TT) on paremman herkkyytensä (86–100 %) ja tarkkuutensa (79–100 %) ansiosta käytännössä syrjäyttänyt gammakuvauksen (**KUVA 2**) (12). Kasvaimen luokittelu vaatii histologisen biopsian, mikäli se on teknisesti mahdollinen. Jos vatsanpeit- teiden läpi otettava biopsia ei ole mahdollinen, voidaan yrittää endoskooppista kaikukuvaus-



**KUVA 1.** Hypervaskulaaristen kasvainten erotusdiagnoos- tika on välillä mahdotonta pelkän radiologisen kuvan- tamisen perusteella. Toisiaan muistuttavat radiologiset kuvat munuaiskarsinooman etäpesäkkeestä (A), lisäper- nasta (B), kystisestä NE-kasvaimesta (C) ja tavallisesta NE-kasvaimesta (D). Diagnoosit vahvistuivat, kun muutok- set poistettiin ja tutkittiin histologisesti.



**KUVA 2.** Kasvaimen varmistaminen NE-kasvaimeksi. **A)** TT tai magneettikuva. **B)**  $^{66}\text{Ga}$ -DOTANOC-PET-TT, jossa kasvain (ympyröity) ja munuaiset latautuvat voimakkaasti.

ohjattua näytteenottoa gastroskopiasteitse mahalaukun läpi. Veren kasvainmerkkiaineiden kromograniniin A:n ja haimapolypeptidin (PP) pitoisuudet on syytä tutkia. Kromograniniin A on tärkeä merkkiaine NE-kasvainten diagnostiikan lisäksi niiden hoitovasteen ja etenemisen arvioinnissa. Se ei kuitenkaan ole spesifinen NE-kasvainmerkkiaine, sillä suurentuneita pitoisuuksia tavataan myös atrofisen gastriitin ja munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä sekä potilailla, jotka käyttävät protonipumpun estäjiä.

MEN 1 -oireyhtymän varhaisin ja yleisin ilmentymä on lisäkilpirauhasen liikatoiminta, joka voidaan sulkea pois tai todeta tutkimalla ionisoituneen kalsiumin ja lisäkilpirauhashormonin pitoisuudet. MEN 1 -oireyhtymässä haiman NE-kasvaimet ovat usein multippleita. Haiman kasvaintaakan arviointi on tärkeää, ja siihen soveltuvat parhaiten haiman magneettikuvaus ja haiman endoskooppinen kaikukuvaus, jotka täydentävät toisiaan (2).

**TAULUKKO 3.** Haiman pienten toimimattomien NE-kasvainten seurantakriteerit (15,16). Kaikkien kriteerien tulee täyttyä.

Diagnoosi vahvistettu joko biopsialla tai $^{66}\text{Ga}$ -DOTANOC-PET-TT:llä
Läpimitta enintään 20 mm
Ei haima- tai sappitiehyen dilataatiota
Ei viitteitä paikallisesta invaasiosta tai imusolmuke-etäpesäkkeistä
Oireeton tai sattumalöydös
WHO-luokka G1 (jos tiedossa)

G = gradus

## Hoito

**Pieni, alle 2 cm:n kokoinen haiman NE-kasvain.** Läpimitaltaan alle 2 cm:n kasvaimet ovat lähes aina sattumalöydöksiä. Ne eivät yleensä aiheuta oireita ja käyttäytyvät varsin indolentisti. Useissa kansainvälisissä suosituksissa on ehdotettu seurantalinjaa ja vain suurenevien kasvainten kirurgista poistoa (1,2). Toisaalta on huomattava, että osa suosituksista ehdottaa radikaalia kirurgiaa myös pienten kasvainten hoidoksi tai pitää rajana 1 cm:n läpimittaa (13,14). Seuranta toteutetaan TT:llä tai magneettikuvauksella. Ensimmäinen seurantakuvaus on syytä tehdä jo kolmen kuukauden päästä, minkä jälkeen väliä voidaan pidentää 6–12 kuukauden mittaiseksi. Seuranta kannattaa jatkaa niin kauan kuin potilaan ajatellaan olevan kajoavien hoitojen piirissä. ENETS suosittelee leikkaushoitoa, jos 6–12 kuukauden seurannassa todetaan vähintään 0,5 cm:n kasvu (2).

Tuoreen meta-analyysin perusteella sattumalta todetuista kasvaimista 22 % kasvoi seurannassa ja vain 12 % poistoleikattiin (15). Ennen seurantalinjalle ryhtymistä tulee kuitenkin olla kohtalaisen varma kasvaimen indolentista luonteesta, ja tiettyjen kriteerien tuleekin täytyä (**TAULUKKO 3**) (15,16). Toisaalta tulee myös huomioida, että haimakirurgiaan liittyy merkittävä komplikaatoriski ja leikkauskuolleisuus (**TAULUKKO 4**) (17).

NE-kasvainmuutosten yhteydessä potilaan muu haima on usein varsin normaali, minkä vuoksi näiden potilaiden riski saada komplika-

**TAULUKKO 4.** Haiman NE-kasvainten leikkausten komplikaatiot eri leikkaustyypeittäin 62 alkuperäisjulkaisusta (2 643 potilasta) tehdyn systemoidun katsauksen perusteella (17).

	Pankreato- duodenektomia	Distaalinen pan- kreatektomia	Mediaaninen pankreatektomia	Enukleatio
Haimafisteli	14 %	14 %	58 %	45 %
Viivästynyt mahalaukun tyhjeneminen	18 %	5 %	16 %	5 %
Jälkiverenvuoto	7 %	1 %	4 %	6 %
Sairaalakuolleisuus	6 %	4 %	4 %	3 %

tio, kuten haimafisteli, on vielä suurempi kuin esimerkiksi duktaalisen adenokarsinooman yhteydessä. Potilaiden yleiskunto, oheissairaudet ja elinajan odote vaikuttavatkin päätöksen tekoon. Monisairaana vanhuksen leikkaukseen liittyvät riskit ovat suuret ja mahdollinen tuleva seuranta-aika verrattain lyhyt. Nuoren hyväkuntoisen potilaan edessä saattaa olla kymmenien vuosien seuranta, ja leikkaus on vähemmän riskialtis. Tuore ENETS:n suositus kehottaakin leikkaamaan nuoret hyväkuntoiset potilaat (18). Pieniä kasvaimia leikattaessa voidaan harkita tehtäväksi haimaa säästävä leikkaus. Enukleatio on tällainen, ja siinä kasvain poistetaan tervekudoksen myötäisesti ”kuorimalla” tai hyvin pienellä tervekudosmarginaalilla niin, että säästetään muu haima ja haiman päätiehyt. Kasvaimet, jotka parhaiten soveltuvat enukleatioon, ovat pieniä ja kaukana haiman päätiehyestä (**TAULUKKO 5**) (19,20).

Haiman hännässä sijaitseva kasvain on usein suoraviivaisinta poistaa tekemällä distaalinen haimaresektio. Toinen haimaa säästävä leikkautus on mediaaninen pankreatektomia, jossa poistetaan vain haiman runko. Haiman pään puoleinen katkaisupinta suljetaan ompelemalla tai suorasulkuinstrumentilla (stapler), ja jejunumin haara liitetään häntäosaan Roux-en-Y-tyyppisesti (**KUVA 3**).

Haimaa säästävän leikkauksen hyöty on se, että siihen liittyy 8 % vähemmän haiman endokriinista vajaatoimintaa ja 17 % vähemmän eksokriinista vajaatoimintaa (21). Toisaalta haimaa säästäviin leikkauksiin liittyy enemmän haimanesteen vuotoa vatsaonteloon (haimafisteli), mutta useimmiten siitä aiheutuu vain vähän vakavia ongelmia (**TAULUKKO 4**) (17).

Haimaa säästäviin leikkauksiin voidaan harkinnan mukaan liittää myös paikallinen lymfadenektomia, sillä noin 10 %:lla potilaista, joilla on pieni haiman NE-kasvain, on tautia myös imusolmukkeissa (22).


**Yli 2 cm:n kokoinen haiman NE-kasvain.** Paikallisten suurempien (läpimitta yli 2 cm tai kasvanut seurannassa) haiman NE-kasvainten hoitolinjan valitseminen on suoraviivaisempaa, sillä niitä suositellaan radikaalisti leikattavaksi WHO-luokasta riippumatta, mikäli se on teknisesti mahdollista (14,23,24). Jos kasvain on läpimitaltaan alle 4 cm:n kokoinen, voidaan harkita haimaa säästävää leikkausta, mutta usein läpimitaltaan 2–4 cm:n kokoiset kasvaimet eivät sovellu leikattaviksi haimaa säästävällä tekniikalla **TAULUKOSSA 5** esitettyjen seikkojen vuoksi. Vain jos potilas ei ole yleiskunnoltaan soveltuva tai ei itse halua leikkaushoitoon, voidaan harkita seurantaa tai onkologista hoitoa. MEN 1 -potilaiden haiman NE-kasvaimet pyritään ensisijaisesti leikkaamaan säästävästi, koska koko haiman poisto johtaa sekä glukagonin että insuliinin puutteeseen. Tällaisen leikkauksen jälkeen syntyvään insuliinihoitoiseen diabetekseen liittyy usein hypoglykemiaherkkyttä. Haiman poisto aiheuttaa myös eksokriinisen vajaatoiminnan, mutta se on helpommin hallit-

**TAULUKKO 5.** NE-kasvaimen enukleaation indikaatiot (19,20).

Kasvain > 2 mm:n päässä haiman päätiehyestä  
WHO-luokka G1 (jos tiedossa)  
Kasvain < 2–4 cm:n kokoinen  
Kasvain sijaitsee haiman rungon tai pään alueella

G = gradus





**KUVA 3.** Kaavakuva mediaanisesta pankreatektomiasta. Haiman runko on poistettu. Pohjukaissuoleen laskeva haiman pää on suljettu ompelein. Haiman häntä taas on liitetty laskemaan jejunumiin, joka on yhdistetty Roux-en-Y-tyyppisesti ruokaa kuljettavaan ohutsuoleen.

tavissa suun kautta otettavilla entsyymivalmisteilla. Totaalista pankreatektomia voidaan harkita, jos haimassa on useita, seurannassa kasvavia NE-kasvaimia tai jos kasvaimet infiltroivat haimaa laajasti ja kuratiivinen leikkaushoito on mahdollista.

**Metastaattisena todetun haiman NE-kasvaimen kirurginen hoito** on myös mahdollista. Emokasvaimen poiston hyödyistä kokonaisennusteeseen ei ole satunnaistettuun tutkimukseen pohjautuvaa näyttöä, mutta emokasvaimen poisto voi mahdollistaa hoidon fokusoinnin maksaetäpesäkkeisiin, mikäli levinneisyyttä muualle ei ole. Gradus 3 NE-karsinoomien leikkaukseen ei tule ryhtyä, mutta gradus 3 NE-kasvainten leikkausta voidaan harkita, mikäli kaikki maksaetäpesäkkeet ovat radikaalisti poistettavissa (24). Maksakirurgian periaatteet pätevät myös NE-kasvainten etäpesäkkeiden poistoon: taudin tulee olla kuratiivisesti poistettavissa niin, että jäljelle jäävän maksan toiminnallinen tilavuus on riittävä (25). Maksakirurgiaa voidaan joskus harkita myös, vaikka tautia olisi maksan ulkopuolellakin, jos se on hoidettavissa muulla tavalla. Gradus 1–2 NE-kasvainten debulking-leikkausta voidaan harkita sillä edellytyksellä, että tautia ei ole muualla kuin maksassa ja että vähintään 90 %

kasvainmassasta saadaan poistetuksi (23). Yleensä debulkingiin ryhdytään vasta, kun tauti aiheuttaa oireita tai etenee lääkehoidosta huolimatta (25). Myös termoablaatiota erikseen tai yhdessä leikkauksen kanssa, transarteriaalista (kemo)embolisaatiota, kudoksensisäistä lyhytetäisyysistä sädehoitoa (brakyterapia) ja selektiivistä sisäistä sädehoitoa (SIRT) voidaan harkita maksaetäpesäkkeiden hoitoon tarkkaan valikoiduissa tapauksissa (23). Näiden hoitojen luonne on kuitenkin enemmän syövän etenemistä jarruttava kuin kuratiivinen.


**Lääkehoidon** algoritmi esitetään **KUVASSA 4**. Yli 90 %:ssa NE-kasvaimista on somatostatiinireseptoreita, jotka voidaan todeta <sup>66</sup>Ga-DOTANOC-PET-TT:llä. Somatostatiinireseptori-analogihoitoa (oktreotidi ja lanreotidi) käytetään gradus 1–2 NE-kasvainten hoidossa toiminnallisten kasvainten aiheuttamien oireiden hillitsemiseksi ja kasvaimen kasvua hidastavan vaikutuksen vuoksi. Kasvua hidastava teho on osoitettu potilailla, joiden kasvaimen Ki-67-proliferaatioindeksi oli enintään 10 %, mutta sitä voidaan käyttää myös kasvaimiin, joiden Ki-67-proliferaatioindeksi on suurempi, kunhan vaste arvioidaan yksilöllisesti. Pitkävaikutteinen somatostatiinianalogi lanreotidi venytti edennyttä suolikanava- tai haimälähtöistä neuroendokriinista syöpää sairastavien potilaiden taudin etenemättömyysajan 33 kuukauteen, kun lumelääkittyjen tulos oli 18 kuukautta (26). Jos potilas on leikkaushoidon jälkeen kuvantamistutkimusten perusteella tauditon, somatostatiinianalogihoitoa ei aloiteta liitännäishoidoksi vaan potilas jää seurantaan. Haiman NE-kasvainten interferonihoidon tehoa ei ole osoitettu.

Neuroendokriinisen syövän etenemistä jarruttavaa solunsalpaajahoidoa streptotsotoosiiniin ja fluorourasiiliin tai temotsolomidin ja kapesitabiiniin yhdistelmiä käytetään, jos potilaan tauti etenee somatostatiinianalogihoidosta huolimatta, jos kasvaintaakka on suuri tai jos Ki-67-proliferaatioindeksi on alle 20 %. Temotsolomidin ja kapesitabiiniin yhdistelmä soveltuu myös potilaille, joiden Ki-67-proliferaatioindeksi on yli 20 %. Streptotsotoosiiniin ja fluorourasiiliin yhdistelmä on osin menettämässä asemaansa etenkin haittavaikutustensa

vuoksi. Sen tilalle on nousemassa kapesita-  
biinin ja temotsolomidin yhdistelmä, mut-  
ta suora kolmannen vaiheen tutkimuksessa  
tehty näiden hoitojen välinen vertailu puut-  
tuu (3). <sup>66</sup>Ga-DOTANOC-PET-TT:n ker-  
tymäintensiteetin pohjalta voidaan harkita  
<sup>177</sup>lutetium-oktreotaattihoitoa etäpesäkkeiden  
tai paikallisesti edenneen taudin yhteydessä  
(27). Tärkeimmät indikaatiot ovat levinnyt,  
inoperaabeli ja etenevä tauti sekä kasvaimen  
<sup>66</sup>Ga-DOTANOC-PET-TT-positiivisuus. <sup>177</sup>lu-  
tetium-oktreotaattihoito edellyttää riittävän  
hyvää luuytimen, maksan ja munuaisten toi-  
mintaa (1). Hoito tehoaa paremmin gradus  
1–2 kuin gradus 3 tauteihin.

Everolimuusia ja sunitinibia voidaan käyttää  
edenneen, gradus 1–2 taudin hoidossa erityi-  
sesti solunsalpaajahoidon jälkeen: molempien  
lääkkeiden osalta taudin etenemättömyysaika  
oli kolmannen vaiheen tutkimuksessa yksitoi-  
sta kuukautta, kun lumelääkityillä eteneminen  
todettiin keskimäärin viiden kuukauden kulut-  
tua (3). Takautuvien tutkimusten perusteella  
tavanomaisen platinapohjaisen solunsalpa-  
ajahoidon teho on heikompi, kun hoidetaan  
gradus 3 NE-kasvaimia, joiden Ki-67-prolife-  
raatioindeksi on alle 55 %. Kapesitabiinin ja te-  
motsolomidin yhdistelmä näyttää tehoavan pa-  
remmin näiden potilaiden tauteihin. Gradus 3  
NE-karsinoomien karboplatiinipohjainen hoi-  
to oli yhtä tehokasta kuin niiden sisplatiinipoh-  
jainen hoito.

**Maksansiirto** voi tulla kyseeseen hyvin vali-  
koiduissa tapauksissa. Yleisesti siirtoa voidaan  
harkita, jos potilaan katsotaan todella hyöty-  
vän siitä oireiden väistyttyä. Lisäksi taudin  
tulisi olla rajoittunut maksaan mielellään niin,  
että seuranta-aika on ollut riittävän pitkä, esi-  
merkiksi vuosi maksanulkoisten kasvaimien  
poiston jälkeen. Kasvaimen Ki-67-proliferaa-  
tioindeksin tulee myös olla alle 10 % (gradus  
1–2). Lisäksi siirtoa ei tule tehdä liian iäkkäille.  
Kaikki muut hoidot tulee myös olla kokeiltu ja  
todettu hyödyttömiksi. Lisäksi potilaan tulee  
olla muuten yleiskunnoltaan ja liitännäissai-  
rauksiensa osalta soveltuva maksansiirtoon.  
Suomessa on tehty kaikkiaan neljä maksansiir-  
toa levinneen NE-kasvaimen vuoksi, joskaan  
nämä kasvaimet eivät olleet haimaperaisiä.



KUVA 4. Lääkehoito.

## Ennuste

Tärkeimmät ennusteeseen vaikuttavat tekijät  
ovat kasvaimen levinneisyys ja WHO-luokka.  
Pienten ( $\leq 2$  cm:n läpimittaisten) paikallisten  
gradus 1–2 kasvainten ennuste on erinomainen,  
sillä viisi vuotta leikkauksen jälkeen 94 %  
potilaista on taudittomia (28). Hyksin takau-  
tuvasta pilottiaineistosta löytyi kuusi potilasta,  
joiden pientä toimimatonta sporadista kasvain-  
ta oli jääty seuraamaan. Yhden potilaan kas-  
vain oli kasvanut 1 mm:n, muiden kasvaimet  
pysyivät muuttumattomina seuranta-aikana,  
jonka mediaani oli 58 kuukautta (julkaisema-  
ton havainto). Gradus 1 kasvainten ennuste on  
yleensä erittäin hyvä, ja potilaat saattavat elää  
levinneenkin taudin kanssa useita vuosia.

Hyksin aineistossa taudittoman ajan mediaa-  
ni haiman NE-kasvaimen leikkauksen jälkeen  
oli gradus 2 kasvainten osalta 25 kuukautta  
(vaihteluväli 2–49 kk) ja gradus 3 kasvainten  
(NE-kasvain tai NE-karsinooma) osalta 7 kuu-  
kautta (1–13 kk) (29). Gradus 1–2 levinneen-  
kin NE-kasvaimen yhteydessä elinajan odote  
on yleensä useita vuosia, mutta tarkkojen en-  
nusteiden arvioiminen on vaikeaa muuttuvien  
luokittelujen ja uusien hoitojen vuoksi. Ete-  
nevissä tutkimuksissa graduksen 1–2 meta-  
staattisen NE-kasvaimen yhteydessä potilaiden  
kokonaiselinaika on ollut hyvinkin vaihteleva,  
20–83 kk (30–32).



## Ydinasiat

- ▶ Haiman neuroendokriinisia kasvaimia löydetään yhä enemmän sattumalöydöksinä muiden syiden vuoksi tehtyjen kuvantamisten yhteydessä.
- ▶ Pieniä kasvaimia on mahdollista myös seurata, mutta erityisten kriteerien tulee täyttyä ja harkinta tehdään yksilöllisesti.
- ▶ TNM- ja histologinen WHO-luokittelu ovat muuttuneet vuonna 2017.
- ▶ Kasvaimen poistava leikkaus on ainoa kuratiivinen hoitomuoto.
- ▶ Uudet hoitomuodot mahdollistavat pitkän eliniän usein myös, kun tauti on levinnyt.

Gradus 3 kasvainten ennusteeseen vaikuttavat patologin määrittämä morfologinen erilaistuminen ja Ki-67-proliferaatioindeksi: gradus 3 NE-kasvainten ennuste on selkeästi parempi kuin proliferaatioindeksiltään vastaavien gradus 3 NE-karsinoomien (33,34). Metastasoituneen taudin tärkeimpiä ennustekijöitä ovat kasvaimen kasvunopeus, Ki-67-proliferaatioindeksi ja maksan kasvainmassa (35).

Takautuvassa suolikanava- ja haimalähtöisten NE-kasvainten aineistossa gradus 3 NE-

kasvainten, joiden Ki-67-proliferaatioindeksi oli alle 55 %, yhteydessä kokonaiselinaika oli 44 kk. Jos Ki-67-proliferaatioindeksi oli gradus 3 NE-karsinoomien yhteydessä alle 55 %, kokonaiselinaika oli 24 kk, ja kun indeksi oli vähintään 55 %, vain 5 kk (33).

## Lopuksi

Haiman toimimattoman NE-kasvaimen hoitoratkaisuihin vaikuttavat kasvaimen koko, levinneisyys ja WHO-luokka sekä potilaan yleiskunto ja oheissairaudet. Optimaalisiin lähestymistapa ei pienten kasvainten osalta ole vielä tiedossa. WHO-luokitus ei ole aukoton eikä usein tehtävissäkään ennen leikkausta, jos histologista näytettä ei saada tai tarvita. Toisaalta jopa hyvin erilaistuneet kasvaimet voivat lähettää etäpesäkkeitä. Jos syöpä on edennyt, histologinen näyte on tärkeä potilaan hoitomahdollisuuksien kartoittamiseksi. Molekyylibiologiset luokittelut tai WHO-luokkaa vastaavat kuvantamistutkimukset saattavat tulevaisuudessa tarkentaa haiman toimimattomien NE-kasvainten diagnostiikkaa ja siten mahdollistaa yksilöidynnä hoidon. NE-kasvainmuutosten hoidon arviointi on vaativaa, ja moniammatillinen lähestymistapa (endokrinologi, onkologi, kirurgi, radiologi, patologi) on välttämätön. ■

**VILLE SALLINEN, dosentti, erikoislääkäri**

Vatsaelinkirurgia, Elinsiirto- ja maksakirurgia, Vatsakeskus, HYKS ja Helsingin yliopisto

**CAMILLA SCHALIN-JÄNTTI, dosentti, osastonylilääkäri**

Endokrinologia, Vatsakeskus, HYKS ja Helsingin yliopisto

**LIISA LUUKKONEN, LL, erikoistuva lääkäri**

**JUKKA SIRÉN, LKT, hallinnollinen ylilääkäri**

Vatsaelinkirurgia, Vatsakeskus, HYKS ja Helsingin yliopisto

**ARNO NORDIN, LT, erikoislääkäri**

Elinsiirto- ja maksakirurgia, Vatsakeskus, HYKS ja Helsingin yliopisto

**JOHANNA AROLA, dosentti, osastonylilääkäri**

Patologian linja, HUSLAB ja Helsingin yliopisto

**MAIJA TARKKANEN, dosentti, linjajohtaja**

Syöpäkeskus, HYKS ja Helsingin yliopisto

## SIDONNAISUDET

**Ville Sallinen:** Luentopalkkio/asiantuntijapalkkio (Vantaan kaupunki, Suomen Gastroenterologiyhdistys ry, Novartis), korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Astellas)

**Camilla Schalin-Jäntti:** Apuraha (Novartis, Pfizer, Ipsen), luontopalkkio/asiantuntijapalkkio (Novartis, Pfizer, Ipsen), korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Alexion, Ipsen)

**Liisa Luukkonen:** Ei sidonnaisuuksia

**Jukka Sirén:** Ei sidonnaisuuksia

**Arno Nordin:** Luentopalkkio/asiantuntijapalkkio (RAS-symposiumi, AMGEN, Tillots Pharma AB, Vifor Pharma Nordiska AB), korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Olympus, Abbvie)

**Johanna Arola:** Luentopalkkio/asiantuntijapalkkio (Novartis, IPSEN)

**Maija Tarkkanen:** Luentopalkkio/asiantuntijapalkkio (Novartis, Mediuutiset, Ipsen, Teva), korvaukset koulutus- ja kongressikuluista (Teva, MSD), osakkuus (Tale Verum Oy)

## KIRJALLISUUTTA

- Janson ET, Sorbye H, Welin S, ym. Nordic guidelines 2014 for diagnosis and treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms. *Acta Oncol* 2014; 53:1284–97.
- Falconi M, Eriksson B, Kaltsas G, ym. ENETS consensus guidelines update for the management of patients with functional pancreatic neuroendocrine tumors and non-functional pancreatic neuroendocrine tumors. *Neuroendocrinology* 2016;103:153–71.
- Pavel M, O'Toole D, Costa F, ym. ENETS consensus guidelines update for the management of distant metastatic disease of intestinal, pancreatic, bronchial Neuroendocrine Neoplasms (NEN) and NEN of unknown primary site. *Neuroendocrinology* 2016;103:172–85.
- Hallett J, Law CHL, Cukier M, ym. Exploring the rising incidence of neuroendocrine tumors: A population-based analysis of epidemiology, metastatic presentation, and outcomes. *Cancer* 2014;121:589–97.
- Jensen RT, Berna MJ, Bingham DB, ym. Inherited pancreatic endocrine tumor syndromes: advances in molecular pathogenesis, diagnosis, management, and controversies. *Cancer* 2008;113(Suppl 7):1807–43.
- Ito T, Igarashi H, Uehara H, ym. Causes of death and prognostic factors in multiple endocrine neoplasia type 1: a prospective study: comparison of 106 MEN1/Zollinger-Ellison syndrome patients with 1613 literature MEN1 patients with or without pancreatic endocrine tumors. *Medicine (Baltimore)* 2013;92:135–81.
- Scarpa A, Mantovani W, Capelli P, ym. Pancreatic endocrine tumors: improved TNM staging and histopathological grading permit a clinically efficient prognostic stratification of patients. *Mod Pathol* 2010;23:824–33.
- Rindi G, Klöppel G, Alhman H, ym. TNM staging of foregut (neuro)endocrine tumors: a consensus proposal including a grading system. *Virchows Arch* 2006; 449:395–401.
- Rindi G, Falconi M, Klersy C, ym. TNM staging of neoplasms of the endocrine pancreas: results from a large international cohort study. *J Natl Cancer Inst* 2012; 104:764–77.
- Lloyd R, Osamura RY, Klöppel G, ym. toim. WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs. WHO/IARC Classification of Tumours. 4. painos. Geneva: World Health Organization 2017.
- Yang M, Zeng L, Zhang Y, ym. TNM staging of pancreatic neuroendocrine tumors: an observational analysis and comparison by both AJCC and ENETS systems from 1 single institution. *Medicine (Baltimore)* 2015;94:e660.
- Kartal N, Mucelli RMP, Sundin A. Recent developments in imaging of pancreatic neuroendocrine tumors. *Ann Gastroenterol* 2015;28:193–202.
- Öberg K, Knigge U, Kwekkeboom D, ym. Neuroendocrine gastro-entero-pancreatic tumors: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol* 2012;23(Suppl 7):vii124–30.
- NCCN Guidelines. Neuroendocrine Tumors. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). [www.nccn.org/](http://www.nccn.org/).
- Sallinen V, Le Large TYS, Galeev S, ym. Surveillance strategy for small asymptomatic non-functional pancreatic neuroendocrine tumors: a systematic review and meta-analysis. *HPB (Oxford)* 2017; 19:310–20.
- Gaujoux S, Partelli S, Maire F, ym. Observational study of natural history of small sporadic nonfunctioning pancreatic neuroendocrine tumors. *J Clin Endocrinol Metab* 2013;98:4784–9.
- Jilesen APJ, Eijck CHJ, Hof KHI, ym. Post-operative complications, in-hospital mortality and 5-year survival after surgical resection for patients with a pancreatic neuroendocrine tumor: a systematic review. *World J Surg* 2016;40:729–48.
- Partelli S, Bartsch DK, Capdevila J, ym. ENETS Consensus Guidelines for standard of care in neuroendocrine tumours: surgery for small intestinal and pancreatic neuroendocrine tumours. *Neuroendocrinology* 2017;105:255–65.
- Faitot F, Gaujoux S, Barbier L, ym. Reappraisal of pancreatic enucleations: a single-center experience of 126 procedures. *Surgery* 2015;158:201–10.
- Brient C, Regenet N, Sulpice L, ym. Risk factors for postoperative pancreatic fistulization subsequent to enucleation. *J Gastrointest Surg* 2012;16:1883–7.
- Hüttner FJ, Koessler-Ebs J, Hackert T, ym. Meta-analysis of surgical outcome after enucleation versus standard resection for pancreatic neoplasms. *Br J Surg* 2015;102:1026–36.
- Hashim YM, Trinkaus KM, Linehan DC, ym. Regional lymphadenectomy is indicated in the surgical treatment of pancreatic neuroendocrine tumors (PNETs). *Ann Surg* 2014;259:197–203.
- Falconi M, Bartsch DK, Eriksson B, ym. ENETS Consensus Guidelines for the management of patients with digestive neuroendocrine neoplasms of the digestive system: well-differentiated pancreatic non-functioning tumors. *Neuroendocrinology* 2012;95:120–34.
- Crippa S, Partelli S, Belfiori G, ym. Management of neuroendocrine carcinomas of the pancreas (WHO G3): A tailored approach between proliferation and morphology. *World J Gastroenterol* 2016; 22:9944–53.
- Haugvik SP, Janson ET, Österlund P, ym. Surgical treatment as a principle for patients with high-grade pancreatic neuroendocrine carcinoma: a nordic multicenter comparative study. *Ann Surg Oncol* 2016;23:1721–8.
- Caplin ME, Pavel M, Cwikla JB, ym. Lanreotide in metastatic enteropancreatic neuroendocrine tumors. *N Engl J Med* 2014;371:224–33.
- Kwekkeboom DJ, Krenning EP. Peptide receptor radionuclide therapy in the treatment of neuroendocrine tumors. *Hematol Oncol Clin North Am* 2016; 30:179–91.
- Sallinen VJ, Le Large TTY, Tiefrunk E, ym. Prognosis of sporadic resected small ( $\leq 2$  cm) nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumors: a multi-institutional study. *HPB (Oxford)* 2017. DOI: 10.1016/j.hpb.2017.08.034.
- Sallinen V, Haglund C, Seppänen H. Outcomes of resected nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumors: Do size and symptoms matter? *Surgery* 2015; 158:1556–63.
- Kotteas EA, Syrigos KN, Saif MW. Profile of capecitabine/temozolomide combination in the treatment of well-differentiated neuroendocrine tumors. *Onco Targets Ther* 2016;9:699–704.
- Yao JC, Pavel M, Lombard-Bohas C, ym. Everolimus for the treatment of advanced pancreatic neuroendocrine tumors: overall survival and circulating biomarkers from the randomized, phase III RADIANT-3 Study. *J Clin Oncol* 2016; 34:3906–13.
- Faivre S, Niccoli P, Castellano D, ym. Sunitinib in pancreatic neuroendocrine tumors: updated progression-free survival and final overall survival from a phase III randomized study. *Ann Oncol* 2017; 28:339–43.
- Milione M, Maisonneuve P, Spada F, ym. The clinicopathologic heterogeneity of grade 3 gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms: morphological differentiation and proliferation identify different prognostic categories. *Neuroendocrinology* 2017;104:85–93.
- Sorbye H, Welin S, Langer SW, ym. Predictive and prognostic factors for treatment and survival in 305 patients with advanced gastrointestinal neuroendocrine carcinoma (WHO G3): the NORDIC NEC study. *Ann Oncol* 2013;24:152–60.
- Foulfou M, Graillet E, Adham M, ym. Treatment of metastatic pancreatic neuroendocrine tumors: relevance of ENETS 2016 guidelines. *Endocr Relat Cancer* 2017;24:71–81.

## SUMMARY

### Non-functional pancreatic neuroendocrine tumors – national guidelines

Nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumors (NF-PNET) are being increasingly diagnosed owing to the more frequent use of modern imaging technologies. Behavior of NF-PNETs varies from indolent tumors to extremely aggressive carcinomas. Recent WHO classification (2017) captures this variability by dividing NETs into three grades and further classifies the most aggressive and poorly differentiated tumors as neuroendocrine carcinomas (NEC). Small, grade 1 NF-PNETs are candidates for surveillance, but surgical resection is necessary for curative treatment. Resections carry a high risk of complications, highlighting the importance of patient selection. Curative treatment is possible in local disease, and life expectancy for patients with disseminated disease has increased due to novel treatment options. Prognosis in patients with grade 1–2 NF-PNETs is excellent and many are alive for decades after diagnosis.